


Erosion af Sermermiut-bopladsen

Bilag 6 – Eroderede knogler på stranden

David Barry, Kalundborg Arkæologiforening



Modificeret fra Ole Bennike et al. 2004, "Ilulissat Isfjord", modificeret fra Tinna Møbjerg, 1983.

Figurerne viser tilfældige billeder af knogler på stranden ved Sermermiut-bopladsen. Det kan ses at strandens overflade er dækket med knogler der er eroderet ud af kystskrænten. En del af disse er bearbejdede.

Eftersom de ca. 150 knogler som forfatteren opsamlede fra overfladen af stranden i løbet af ca. 15 min (fig. 6-27), antages at repræsentere mindre end en procent af knoglerne på overfladen, og eftersom fem af disse var bearbejdede (1 harpunhoved, 1 pren, 1 ajagaq-spil og 2 restprodukter), kan det antages at der ligger flere hundred bearbejdede knogler på stranden, inklusive et par hundred redskaber. Ved af løfte på stenene finder man meget mere, og det må antages at der ligger meget knoglemateriale begravet i sedimentet/sandet.

En gennemgang af billederne ved hjemkomsten identificerede flere knogler der tilsyneladende er bearbejdede (fig. 6-3, 6-4 og 6-5).




Fig. 6-1. Typisk distribution af eroderede knogler på stranden.




Fig. 6-2. Ud over knogler (røde pile) ses der af og til klumper af tørv (grøn pil) der er faldet ud af kystskrænten.



Fig. 6-3. Blandt knoglerne (røde pile) findes der tilsyneladende bearbejdede knogler (grøn pil).



Fig. 6-4. Her ses et tilsyneladende bearbejdet knoglefragment.



Fig. 6-5. Endnu et tilsyneladende bearbejdet knoglefragment med afrundet spids.



Fig. 6-6. Diverse knogler.



Fig. 6-7. do.



Fig. 6-8. do.



Fig. 6-9. Thule type 2-harpunhoved med surringsriller.



Fig. 6-10. Lige ved foden af kystskrænten. Harpunhoved (rød pil) og en klump tørv der er faldet ned fra brinken (grøn pil).



Fig. 6-11. Diverse knogler.



Fig. 6-12. do.



Fig. 6-13. do.



Fig. 6-14. do.



Fig. 6-15. do.



Fig. 6-16. do.



Fig. 6-17. do.



Fig. 6-18. do.



Fig. 6-19. do.



Fig. 6-20. do.



Fig. 6-21. do.



Fig. 6-22. do.



Fig. 6-23. do.



Fig. 6-24. Knogle i vandløbet mellem kystskrænt A og B.



Fig. 6-25. do.



Fig. 6-26. do.



Fig. 6-27. Knoglerne opsamlet på stranden i løbet af ca. 15 min. De ca. 150 knogler repræsenterer nok mindre end en procent af knoglerne på stranden. Knoglerne er afleveret til Ilulissat Museum (bilag 7). De bearbejdede knogler er på grundlag af billeder identificeret af Bjarne Grønnow og Hans Christian Gulløv, Danmarks Nationalmuseum, København. En del af de øvrige knogler er på grundlag af billeder identificeret af Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, København.